



สวนพฤกษศาสตร์ ราชภัฏ



ตะขบฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Muntingia calabura</i> L.
ชื่อวงศ์	MUNTINGIACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ครบฝรั่ง (สุราษฎร์ธานี), ตะขบฝรั่ง (ทั่วไป)
ชื่อสามัญ	Bajelly tree, Jamaican cherry, Panama berry, Strawberry tree
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น เปลือกสีเทา กิ่งแผ่สาขาขนานกับพื้นดิน ตามกิ่งมีขนนุ่มปกคลุมและปลายเป็นตุ่ม เมื่อจับยอดอ่อนจะเหนียวมีเล็กน้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบหยัก ฟันเลื่อย มีขนปกคลุมหนาแน่น ก้านใบมีขน ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ ก้านดอกมีขน กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาว กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบแยกกัน สีเขียว รูปหอก ผลกลม ผิวบางเรียบ มีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมากอยู่ภายใน เมื่อสุกสีแดง รสหวานรับประทานได้
นิเวศวิทยา	ถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ พบขึ้นเป็นวัชพืชตามที่รกร้างว่างเปล่าตามป่าโปร่งทั่วไป หรือมักขึ้นเองตามธรรมชาติที่นกและสัตว์ขนาดเล็กถ่ายมูลเมล็ดตะขบทิ้งไว้ ติดดอก ออกผล ตลอดทั้งปี
ประโยชน์	ผลสุกมีรสหวานเย็นหอม มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลัง ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจ