



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



เต่าร้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Caryota mitis</i> Lour.
ชื่อวงศ์	ARECACEAE
ชื่ออื่น ๆ	เขื่องหมู (ภาคเหนือ); ง้อเต็ง (มาบะย์-นราธิวาส); เต่าร้าง (ทั่วไป); เต่าร้างแดง (นครศรีธรรมราช); มะเต็ง ยะลา)
ชื่อสามัญ	Clustered Fishtail Palm
ลักษณะทั่วไป	ลำต้นเดี่ยว สูงได้ถึง 10 เมตร สามารถแตกหน่อด้านข้างในตำแหน่งใต้ดินหรือใกล้ผิวดิน สีแดงเข้มปนน้ำตาลจนเกือบดำ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ใบย่อยรูปสามเหลี่ยมหยักเว้า ปลายแหลมคล้ายหางปลา โคนรูปกลม แผ่นใบสีเขียวเป็นมัน กาบใบยาว มีขนสีน้ำตาลแดงปนเทาหรือสีดำ และมียางค์สีน้ำตาลปกคลุมที่โคน ดอกช่อตามลำต้น ช่อดอกจะมีดอกย่อยออกจากภายใต้กาบใบ ช่อดอกประกอบด้วยดอกเพศผู้ดอกสีเหลืองนวล ดอกเพศเมียสีเหลือง เป็นพวง แขนงช่อดอกจะมีดอกออก 2 ช้าง แบบช่อเชิงลด รวมเป็นกระจุก กระจุกละ 3 ดอก ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ออกเป็นพวง ทรงกลม ผลสุกสีแดงคล้ำ
นิเวศวิทยา	พบที่อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซียฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น หรือป่าเสื่อมโทรม
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับ ยอดอ่อนใช้ปรุงอาหาร ลวกจิ้มน้ำพริก ผลสุกทานได้ ใบใช้มุงหลังคา ทำเครื่องจักสาน