



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



ลำโรง
Sterculia foetida L.
MALVACEAE

ลำโรง

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Sterculia foetida</i> L.
ชื่อวงศ์	MALVACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ฉ่อ, ซอ, ชะกอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ปอขาว (ภาคกลาง); ปอดับแตก (นครราชสีมา); ปอทอง, ปอบ้าน, ปอเผือก (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ	Bastard poom
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 20 ม. มีขนหนาแน่นตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก และผล หูใบรูปใบหอก ใบรูปฝ่ามือ ก้านใบยาว 10–30 ซม. ใบย่อยมี 6–9 ใบ รูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ ยาว 8–25 ซม. ก้านใบย่อยยาว 1–2 มม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 20–30 ซม. ก้านดอกสั้นมาก หลอดกลีบเลี้ยงรูปประฆัง ยาว 4–5 มม. กลีบยาวเท่า ๆ หลอดกลีบเลี้ยง ปลายเชื่อมติดกันด้วยขน เกสรเพศผู้ 15 อัน ไร่ก้านเกสรเพศเมีย ยอดเกสรจัก 5 พู มี 3–5 ผลย่อย รูปคล้ายไต เปลือกหนา ยาว 4–5 ซม. แก่สีแดง มีประมาณ 20 เมล็ด
นิเวศวิทยา	พบที่ลาว และเวียดนาม ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูง 100–900 เมตร
ประโยชน์	เมล็ดให้น้ำมันใช้ปรุงอาหารและจุดไฟ