



สวนพฤกษศาสตร์ ระเบียบ



เฉียงพ้านางแอ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carallia brachiata (Lour.) Merr.

ชื่อวงศ์

RHIZOPHORACEAE

ชื่ออื่น ๆ

แก็ก (ลำปาง); ชิงพ้า, เชียงพ้า (ประจวบคีรีขันธ์, ตราด); เชียงพ้านางแอ (ชุมพร); คอแห้ง, สีฟัน (ภาคใต้); เฉียงพ้า (สุรินทร์); ต่อใต้, สันพ้านางแอ (ภาคกลาง); บงมั่ง (ปราจีนบุรี, อุตรธานี)

ชื่อสามัญ

Freshwater Mangrove Tree.

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 25-35 ม. ผลัดใบ ลำต้นกลมตรง เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ เปลือกสีเทาปนดำ แตกเป็นร่องลึกตามยาวลำต้นหรือเป็นสะเก็ด ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนใบสอบเข้าหากันคล้ายรูปลิ้ม ขอบใบเรียบหรือเป็นรอยจักถี่ ๆ ผิวใบด้านบนเป็นมัน ดอก สีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อกระจุกตามกิ่ง ก้านช่อดอกสั้น กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5-8 แฉก กลีบดอกมี 5-8 กลีบ รูปรางเกือบเป็นแผ่นกลม ผลสดเป็นแบบมีเนื้อ เมล็ดเดี่ยว ทรงกลม เมื่อสุกสีแดง ขนาด 5-7 มม. เมล็ดสีดำ

นิเวศวิทยา

ป่าดิบ ริมลำธารในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าพรุ และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1,300 ม.

ประโยชน์

เปลือก เป็นยาแก้ไข้ ลดความร้อน แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ใบและเปลือก มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้านอนุมูลอิสระ