



สวนพฤกษศาสตร์ รมยอง



มะพอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Parinari anamense Hance

ชื่อวงศ์

CHRYSOBALANACEAE

ชื่ออื่น ๆ

กระท้อนลอก (ตราด); จัต, จัต (ลำปาง); ตะเลาะ, เหลอะ (ส่วย สุรินทร์); ท่าลอก (พิษณุโลก, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี); ประดงไฟ, ประดงเลือด (ราชบุรี); พอก (อุบลราชธานี); มะคลอก (สุโขทัย, อุตรดิตถ์); มะมือ, หมักมือ (ภาคเหนือ); หมักมอก (พิษณุโลก); หมากรอก (ประจวบคีรีขันธ์)

ชื่อสามัญ

-

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่ม ลำต้นเปลว เปลือกสีน้ำตาลปนเทา เป็นสะเก็ดถี่ ๆ ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยว ติดเรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข่ โคนใบมน ปลายใบหยักคอด เป็นติ่งสั้น ๆ เนื้อใบหนา ท้องใบมีคราบขาวเด่นชัด ขอบใบเรียบ ดอก ออกดอกรวมกันเป็นช่อสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง มีก้านดอกสั้นมาก ดอกย่อยเล็ก สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ บริเวณโคนกลีบ ร่องกลีบดอกจะเชื่อมเป็นรูปกรวยปากกว้าง ส่วนปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ แยกกัน มีความยาวเท่า ๆ กับกลีบรองกลีบดอก เกสรผู้มี 5-12 อัน รังไข่รูปทรงกลม ผล รูปรีหรือทรงกลม ผิวขรุขระมีตุ่มหรือสะเก็ดสีเทาปนน้ำตาลทั่วไป กว้างประมาณ 3 ซม. ยาว 3-4 ซม.

นิเวศวิทยา

สามารถขึ้นได้ทั้งป่าดงดิบ ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณทั่วไปทุกภาค ตั้งแต่ระดับน้ำทะเล จนสูงถึง 1500 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-เมษายน

ประโยชน์

เปลือก ประคบแก้ไข้ในและปวดบวม แก่น ต้มน้ำดื่มและอาบ แก้ประดง แก้ผื่นคันทั่วตัว ปวดแสบปวดร้อน มีน้ำเหลืองไหลซึม รักษาโรคหิด