



สวนพฤกษศาสตร์ระยอง



เขื่องหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caryota maxima Blume

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

ชื่ออื่น ๆ

เขื่องใหญ่ (ภาคเหนือ); เต่าร้างยักษ์ (ภาคกลาง, ภาคใต้)

ชื่อสามัญ

-

ลักษณะ

ปาล์มลำต้นเดี่ยว สูงได้ประมาณ 30 ม. ลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 25-65 ซม. ใบออกตามลำต้น ช่วงครึ่งบน ออกหนาแน่นใกล้ยอด ก้านใบยาว 10-30 ซม. แขนกกลางใบประกอบยาว 2.5-4.5 ม. ใบประกอบย่อยแรกมีประมาณ 30 ใบ ในแต่ละข้าง ห้อยลง ใบประกอบย่อยที่สองมีข้างละ 12-27 ใบ ในแต่ละข้าง ใบย่อยขอบจักแหลมลึก ซ่อดอกออกตามซอกใบ ยาวได้ประมาณ 3.5 ม. แขนกกลางช่อยาว 1.5-2 ม. ช่อย่อยจำนวนมาก ดอกเพศผู้ยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 5 มม. กลีบดอกสีเหลืองครีม ยาว 1.2-1.5 มม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก ดอกเพศเมีย ยาวประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 5 มม. กลีบดอกยาว 6-8 มม. ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. สุกสีส้มอมแดง มีเมล็ดเดี่ยว

แหล่งที่พบ

วังกระแพระ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ประโยชน์

มีความสวยงาม เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับบ้านเรือน หรืออาคาร