



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



ตังตาบอด

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Excoecaria oppositifolia</i> Griff.
ชื่อวงศ์	EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ตังตาบอด (ภาคเหนือ); ไฟเดือนห้า (ภาคใต้); ยางร้อน (ลำปาง)
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. แยกเพศต่างต้น หูใบรูปรี ใบเรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 9–30 ซม. แผ่นใบหนา ขอบจักฟันเลื่อย ช่อดอกเพศผู้ยาวได้ถึง 25 ซม. ก้านดอกสั้น ไม่มีกลีบดอก กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 1 มม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ช่อดอกเพศเมียมีดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว ยาว 1.2–1.7 ซม. ในผล ใบประดับและกลีบเลี้ยงยาวกว่าในดอกเพศผู้เล็กน้อย ยอดเกสรยาวกว่าก้านเล็กน้อย ติดทน ผลรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4–6 ซม. จักเป็นพู่สั้น ๆ เมล็ดรูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 1 ซม.
นิเวศวิทยา	พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น โดยเฉพาะริมลำธาร ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร
ประโยชน์	รากรสร้อน เป็นยาขับโลหิต