



# สวนพฤกษศาสตร์ ราชภัฏสุรินทร์



สกุณี  
*Terminalia calamansanay* (Blanco) Rolfe  
COMBRETACEAE

## สกุณี

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Terminalia calamansanay</i> (Blanco) Rolfe
ชื่อวงศ์	COMBRETACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ขี้มอด (นครปฐม); ตาโหลน (สตูล); ตีนนก (จันทบุรี, ตราด); ประคำขี้ควาย (ภาคใต้); เปี้ยแคร์ (เขมร-จันทบุรี); สกุณี, สัตคุณี (ราชบุรี); แหนแดง (ภาคเหนือ); แอ้น (ชุมพร, นครสวรรค์)
ชื่อสามัญ	
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เปลือกแตกออกเป็นสะเก็ดหรือเป็นร่องตื้น มีขนสั้นนุ่ม ประปรายตามกิ่งอ่อน ก้านใบ แกนช่อดอก ใบประดับ กลีบเลี้ยงด้านนอก จานฐานดอก และผล ใบรูปไข่กลับหรือแกมรูปใบหอก ยาว 6–13 ซม. แผ่นใบค่อนข้างเหนียว ด้านล่างมีนวลสีน้ำตาลเทา เส้นกลางใบขนด้านบน เส้นใบย่อยแบบชั้นบันได ก้านใบ ยาว 1–4 ซม. มีต่อมขนหนึ่งคู่เหนือกึ่งกลางก้านใบ ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ยาว 8–16 ซม. มีกลิ่นเหม็น ใบประดับรูปเส้นด้ายขนาดเล็ก ร่วงเร็ว หลอดกลีบเลี้ยงยาว 0.5–0.8 มม. ไม่มีสันตามยาว กลีบยาว 1–1.5 มม. ด้านในมีขนยาวประปราย ปลายกลีบโค้งเข้า เกสรเพศผู้ยาว 3–4 มม. จานฐานดอกจักเป็นพู ก้านยอดเกสรเพศเมียยาว 3.5–4 มม. มีขน ผลผนังชั้นในแข็ง รูปรีหรือรูปขอบขนานแกมสามเหลี่ยม มี 2 ปีก กว้าง 2.5–5 ซม. ยาว 3.5–5 ซม. รวมปีก ด้านล่างมีสัน

นิเวศวิทยา พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตาม  
ป่าเบญจพรรณ ทุ่งหญ้า และไร่ร้าง ทุ่งนา ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ประโยชน์ เปลือกต้นมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงหัวใจ  
ตำรายาไทยจะใช้เป็นยาแก้วิงเวียนในทางเดินปัสสาวะ