



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



อรพิม

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ชื่ออื่น ๆ
ชื่อสามัญ
ลักษณะทั่วไป

Lysiphyllum winitii (Craib) de Wit

FABACEAE

คิ้วนาง (ภาคกลาง)

Thai Bauhinia.

ไม้เถาเนื้อแข็ง มีมือจับ กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล ใบย่อยแฉกกลีจรดโคน มีหูใบขนาดเล็ก 1 อัน ก้านใบประกอบยาวประมาณ 1 ซม. ใบย่อยรูปไข่ เบี้ยว ปลายกลม ยาว 3-4.5 ซม. ด้านล่างมีขนสั้น เส้นแขนงใบออกจากโคน 3-4 เส้น ไร้ก้าน ช่อดอกยาวได้ถึง 20 ซม. ก้านดอกหนา ยาว 4-8 มม. ตาดอกยาวประมาณ 3 ซม. ฐานดอกยาว 4-6 ซม. มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล มีริ้ว กลีบเลี้ยงยาวประมาณกึ่งหนึ่งของฐานดอก แฉกกลีจรดโคน กลีบดอกรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 9 ซม. รวมก้านกลีบ กลีบหน้ามีสีเหลืองอ่อนแซมกว้างกว่าเล็กน้อย ก้านชูอับเรณูสีขาว ยาวได้ถึง 7 ซม. อับเรณูสีน้ำตาล รังไข่รวมก้านยาวประมาณ 4 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ กับรังไข่ ยอดเกสรรูปโล่สีน้ำตาลเข้ม ฝักบางรูปใบหอก บิดงอเล็กน้อย ยาวได้ถึง 30 ซม. มี 6-10 เมล็ด แบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม.

นิเวศวิทยา

พบทางภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงถึงประมาณ 100 เมตร

ประโยชน์

เปลือกต้นใช้เคี้ยวกินกับหมากแทนการใช้สีเสียดได้ เส้นใยจากเปลือกไม้สามารถนำมาใช้ทำเชือกได้ ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เพราะดอกมีความสวยงาม โดยนิยมนำมาปลูกตามริมรั้ว