



สวนพฤกษศาสตร์ ราชภัฏบุรีรัมย์



กระถินณรงค์

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่ออื่น ๆ

ชื่อสามัญ

Earleaf Acacia, wattle.

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. แผ่นก้านใบรูปขอบขนาน โค้ง ปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ด้าน ยาว 8–20 ซม. เส้นใบเรียงขนานกันตามยาว 3–4 เส้น ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ยาว 4–10 ซม. ช่อดอกย่อยแบบช่อกระจุก ดอกไร้ก้าน กลีบเลี้ยงยาว 0.5–1 มม. ขอบจัก กลีบดอกโค้งลง ยาว 1.5–2 มม. เกสรเพศผู้สี่เหลี่ยม ก้านชูอับเรณูยาว 2.5–4 มม. รังไข่มีขนละเอียด ฝักแบน กว้าง 1–1.5 ซม. ยาว 6–7 ซม. บิดม้วนเป็นวง ฝักอ่อนมีนวล มี 5–12 เมล็ด รูปไข่หรือรูปรี ยาว 4–6 มม.

นิเวศวิทยา

มีถิ่นกำเนิดในปาปัวนิวกินีและออสเตรเลีย

ประโยชน์

นำเข้ามาปลูกเป็นสวนป่าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง บำรุงดิน และฟื้นฟูสภาพป่า