



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



เกล็ดปลา
Phyllodium longipes (Craib) Schindl.
FABACEAE

เกล็ดปลา

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Phyllodium longipes</i> (Craib) Schindl.
ชื่อวงศ์	FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ	เกล็ดลิ้นใหญ่ (นครราชสีมา); ลูกลิบตัน (เชียงใหม่)
ชื่อสามัญ	
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 ม. กิ่งอ่อน มีขนนุ่ม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ใบกลางใหญ่ที่สุด รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-25 ซม. โคนมน ถึงหยักเว้าเล็กน้อย ปลายแหลม ด้านล่างมีขนนุ่มแน่น ก้านใบยาว 1.5-2 ซม. ดอก สีขาว รูปดอกถั่ว ออกเป็นกระจุกกลุ่มละ 5-15 ดอก มีใบประกบปิดทั้งสองด้าน ช่อใบประกบยาว 10-30 ซม. รูปกลมรี กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 2.5-4.5 ซม. กลีบรองดอกรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ กว้าง 4 มม. ยาว 8 มม. เกสรผู้ 10 อัน ผล เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 0.4 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. มีหยักเป็นข้อระหว่างเมล็ด 3-5 ข้อ เมื่อแห้งหลุดเป็นข้อๆ เมล็ดเล็ก แข็ง รูปไต
นิเวศวิทยา	พบในจีนตอนใต้ ถึงมาเลเซีย ตามป่าเบญจพรรณและป่าผลัดใบที่ชื้น ที่ระดับความสูง 400-800 ม.
ประโยชน์	รากต้มน้ำดื่ม แก้อาการผิดปกติของตับ และสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนได้ ให้รูปทรงสวยงามแปลกตา