



สวนพฤกษศาสตร์ ราชภัฏบรจ



ทุเรียนเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Annona muricata</i> L.
ชื่อวงศ์	ANNONACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ทุเรียนน้ำ (ภาคใต้), ทุเรียนแขก (ภาคกลาง), มะทุเรียน (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ	Soursop, Prickly custard apple
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้นสูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลตามกิ่งอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปไข่ กลีบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ด้านบนของใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อนกว่า ดอกเดี่ยว จากลำต้นหรือกลางกิ่ง สีเหลือง กลิ่นหอมแรง กลีบรองดอก 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยมเล็ก กลีบดอก อวบหนา มี 6 กลีบ แบ่งเป็น 2 ชั้น เกสรเพศผู้และรังไข่มีเป็นจำนวนมาก ผลกลุ่ม มีเนื้อ รูปกลมป้อมแกมรูปไข่ โคนกว้างกว่าส่วนปลาย เปลือกหนาเหนียว มีหนามโค้งสั้นโดยรอบ สีเขียวเข้มเมื่อสุกสีเหลือง
นิเวศวิทยา	ถิ่นกำเนิดจาก อเมริกาเขตร้อน ในประเทศไทยและ พบปลูกกันมากในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นพืชที่ชอบอากาศที่มีความชื้นสูง
ประโยชน์	ผลดิบ ใช้รับประทาน ผลสุก ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน รากและเปลือก นำมาทำเป็นชาชงดื่มแก้อาการเครียด ช่วยลดอาการเจ็บปวดและลดการเกร็ง