



# สวนพฤกษศาสตร์ระยอง



## ปลาไหลเผือก

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Eurycoma longifolia* Jack

ชื่อวงศ์

SIMAROUBACEAE

ชื่ออื่น ๆ

กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี); คะนาง, ชะนาง (ตราด); ตรึงบาดาล (ปัตตานี); ตูวเบ้าะมิง, ตูวอวมิง (มลายู นราธิวาส); ตุงสอ, แฮพันซัน (ภาคเหนือ); เพี้ยก (ภาคใต้); หยกบ่อถอง, หยกไม่ถึง, เอียนดอน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ไหลเผือก (ตรัง)

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ประมาณ 10 เมตร ไม่มีหูใบ ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาวได้กว่า 1 เมตร เรียงหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง ใบย่อยจำนวนมากเรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม รูปใบหอกแกมรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายใบแหลมหรือแหลมยาว โคนใบเบี้ยว เส้นใบเห็นไม่ชัดเจน ปลายโค้งจรดกัน เส้นกลางใบขนเล็กน้อยด้านบน ขุนเด่นชัดด้านล่าง ใบไว้ก้านหรือเกือบไว้ก้าน ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศร่วมต้นหรือต่างต้น กิ่ง ก้านดอก กลีบเลี้ยงมีขนประปราย และมีต่อมขนกระจาย ดอกสีแดง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5-6 กลีบ ใบประดับรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ร่วงง่าย



# สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

นิเวศวิทยา

การกระจายพันธุ์

ประโยชน์

กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก กลีบดอกรูปใบหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ เกสรเพศผู้ 5-6 อัน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 5-6 อัน ติดระหว่างโคนก้านเกสรเพศผู้ ในดอกเพศเมีย ในดอกเพศผู้ รังไข่มี 5-6 คาร์เพล แยกกัน ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรรูปโล่ห้ มี 5-6 พู ตื่น ๆ ผล แบบเมล็ดเดี่ยวแข็ง มีได้ประมาณ 5 ผล เปลือกนอกบาง ทรงรีหรือรูปไข่

ขึ้นกระจายในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าชายหาด ความสูงตั้งแต่ใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึงประมาณ 700 เมตร ออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว ในไทยพบทั่วทุกภาค

ราก แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น รักษาวัณโรค ถ่ายพิษ ขับเหงื่อ แก้ฟกบวม ถ่ายพิษเสมหะ เปลือกกราก แก้ไข้ เปลือกต้น แก้ไข้มาลาเรีย ผล แก้บิด