



สวนพฤกษศาสตร์ รมยอง



ส้มแขก
Garcinia atrovirdis Griff. ex T. Anderson
CLUSIACEAE

ส้มแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Garcinia atrovirdis</i> Griff. ex T. Anderson
ชื่อวงศ์	CLUSIACEAE
ชื่ออื่น ๆ	มะขามแขก ส้มมะวน (ภาคใต้) ส้มควาย (ตรัง) อาแซกลูโซม (มลายู)
ชื่อสามัญ	Asam gelugur.
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5 -12 เมตร ทรงพุ่มกว้าง แน่น ไม้เนื้อแข็ง เปลือกต้นเรียบ ต้นอ่อนสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลอมดำ เมื่อลำต้นและกิ่งก้านเป็นแผลจะมียางสีเหลืองไหลออกมา ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบใหญ่ผิวเรียบเป็นมัน ใบอ่อนมีสีน้ำตาลอมแดง ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม กว้าง 6-8 ซม. ยาว 12-20 ซม. ดอกเดี่ยวดอกแยกเพศ ออกตามปลายยอด ดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ด้านในสีแดง ด้านนอกมีสีเขียว มีเกสรเพศผู้เรียงอยู่บนฐานรองดอก ดอกเพศเมีย มีขนาดเล็กกว่าดอกเพศผู้ รังไข่มีรูปทรงกระบอก ผลสด ทรงกลมแป้น ผิวเรียบสีเขียว เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม ขนาด 7-9 ซม. เปลือกผลเป็นร่องตามแนวขั้วไปยังปลายผล ประมาณ 8-10 ร่อง ที่ขั้วผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ 2 ชั้น ชั้นละ 4 กลีบ มีเมล็ดแข็ง 2-3 เมล็ดต่อผล อินเดียและศรีลังกา ซึ่งมีปลูกมากในทางภาคใต้ของประเทศไทย
นิเวศวิทยา	

ประโยชน์

ผลส้มแขกมีรสเปรี้ยว นิยมนำมาปรุงอาหารที่ต้องการรสเปรี้ยว ใบอ่อนส้มแขกใช้รอง
ก้นภาชนะนึ่งปลา จะช่วยลดความเนื่อปลา ผลดิบเมื่อโตเต็มที่นำมาตากแห้ง แล้วนำไป
ต้มเคี่ยวในน้ำเชื่อม รับประทานเป็นของหวาน