



สวนพฤกษศาสตร์ รมช.



สัตบรรณ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น ๆ

กะโน๊ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); จะบัน (เขมร-ปราจีนบุรี); ขบา, ดินเปิด (ภาคกลาง); ดินเปิดดำ (นราธิวาส); บะชา, ปูลา, ปูแล (ปัตตานี, มาเลย์-ยะลา); พญาสัตบรรณ (ภาคกลาง); ยางขาว (ลำปาง); สัตบรรณ (ภาคกลาง, เขมร-จันทบุรี); หัสบรรณ (กาญจนบุรี)

ชื่อสามัญ

Blackboard tree, Devil tree, Indian devil tree, Milkwood pine, White cheesewood.

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 ม. กิ่งมีช่องอากาศ ทุใบคล้ายเป็นดิ่งที่ชอกก้านใบ ใบเรียงเป็นวง 4-10 ใบ รูปรี รูปไข่กลับ หรือรูปใบพาย ยาว 4-32 ซม. ปลายแหลมหรือกลม โคนรูปกลมหรือเป็นครีบก้านใบตรงจำนวนมาก ก้านใบยาว 0.7-1.5 ซม. ช่อดอกแน่นเป็นกระจุก ยาว 3-8.5 ซม. ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 1-2 มม. มีขนสั้นนุ่มและขนครุย กลีบดอกเรียงซ้อนทับด้านซ้ายในตาดอก หลอดกลีบยาว 0.5-1 ซม. กลีบรูปรี ยาว 2-5 มม. เกสรเพศผู้ติดเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบ จานฐานดอกเป็นต่อมแยกกัน คาร์เพลมีขน เกสรเพศเมียยาว 3-5 มม. ผลออกเป็นฝักคู่ รูปแถบ ยาว 20-55 ซม. เมล็ดรูปขอบขนาน ยาว 4-8 มม. ขนครุยยาว 1-2 มม.

นิเวศวิทยา

พบที่อินเดีย ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคมาเลเซีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูง 100-1200 เมตร

ประโยชน์

เปลือกและใบแก้ปวดหัว แก้ไข้ หลอดลมและปอดอักเสบ