



สวนพฤกษศาสตร์ รามบอง



จิกน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Barringtonia acutangula</i> (L.) Gaertn.
ชื่อวงศ์	LECYTHIDACEAE
ชื่ออื่น ๆ	จิก (กรุงเทพฯ), กระโดนสร้อย (พิษณุโลก), ลำไฟ (อุตรดิตถ์), กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ (หนองคาย-ภาคอีสาน), ตอง ปุยสาย (ภาคเหนือ), ตอง จิกน้ำ (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ	Indian oak, Itchy tree
ลักษณะทั่วไป	ไม้ยืนต้น สูง 8-15 ม. ผลัดใบเป็นช่วงสั้น ๆ ลำต้น เป็นปุ่มปมและเป็นพู่ทั่วไป เรือนยอด เป็นพุ่มกลมแผ่กว้าง กิ่งก้านสาขาและปลายกิ่งมักลู่ลง เปลือกเรียบสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มบริเวณปลายกิ่ง ใบรูปหอกหรือรูปไข่กลับ ยาวถึง 30 ซม. ปลายใบจะผายกว้างออก โคนใบเรียงเข้าหากันใบ ผิวใบเกลี้ยง ขอบใบยักถี่ ใบก่อนร่วงสีเหลืองถึงแดง ดอกสีแดงออกรวมกันเป็นช่อ ยาวถึง 40 ซม. ผล รูปทรงกลมหรือรูปรี ยาวประมาณ 2.5 ซม. มีสันเป็นเหลี่ยม ตามยาวของผล ที่ปลายผลมีก้านเกลี้ยงยังคงเหลืออยู่
นิเวศวิทยา	ถิ่นกำเนิดทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้และอัฟกานิสถาน ฟิลิปปินส์ ไปจนถึงทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียในแถบรัฐควีนส์แลนด์ และประเทศไทย จะพบได้ทั่วทุกภาคตามริมฝั่งน้ำ ริมคลอง ริมบึง ป่าพรุและป่าชายเลน ติดผลระหว่าง ช่วงติดดอก ออกผล พ.ย.-มี.ค.
ประโยชน์	เปลือกใช้เป็นยาลดไข้และใช้รักษาไข้มาลาเรีย น้ำจากใบช่วยแก้อาการท้องเสีย รากใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ