



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



กรวยป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Casaria grewiiifolia Vent.

ชื่อวงศ์

SALICACEAE

ชื่ออื่น ๆ

ก้วย (ภาคเหนือ); ชุนเหียง, บุนเหียง (สกลนคร); คอแลน (นครราชสีมา); ตวย (เพชรบูรณ์); ตวยใหญ่, ตานเสี้ยน (พิษณุโลก); ผ่าสาม (นครพนม, อุตรธานี); จะร่วย (เขมร สุรินทร์); ผีเสื้อหลวง, สีเสื้อหลวง (ภาคเหนือ)

ชื่อสามัญ

-

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายแหลม โคนมนกว้าง มักเว้าเล็กน้อยที่รอยต่อก้านใบ ขอบจักถี่ แผ่นใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยที่เส้นกลางใบ ด้านล่างมีขนนุ่มทั่วไป ดอกมีจำนวนมาก ออกเป็นกระจุกเล็กๆ ตามง่ามใบที่ใบร่วงไปแล้ว ดอกสมบูรณ์เพศ สีขาวหรือเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงเล็ก ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 8-10 อัน ผลมีเนื้อรูปไข่ ผิวเรียบ ผงงหนา สุกสีเหลือง เนื้อหุ้มเมล็ดสีแสด

นิเวศวิทยา

พบตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด ความสูงตั้งแต่ใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึงประมาณ 1,200 เมตร ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

ประโยชน์

ดอก ใบ แก้ไข้ แก้โรคผิวหนังผื่นคัน เมล็ดแก้ริดสีดวงทวาร และเปลือกใช้ เป็นยาบำรุง น้ำมัน จากเมล็ดทารักษาโรคผิวหนัง