



# สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



## เสลดพังพอนตัวผู้

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Barleria lupulina</i> Lindl.
ชื่อวงศ์	ACANTHACEAE
ชื่ออื่น ๆ	-
ชื่อสามัญ	เซ็กเซเกียม (จีน); พิมเสนตัน, เสลดพังพอน, เสลดพังพอนตัวผู้ (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากชิดกันใกล้ช่อดอก รูปใบหอก ยาว 4-10 ซม. ปลายแหลมเป็นติ่ง โคนสอบเรียว แผ่นใบเกลี้ยงสีเขียวเข้มหรืออมม่วง เส้นกลางใบมักมีสีแดงหรืออมชมพู ก้านใบสั้น มีหนามที่โคนหนึ่งคู่ โค้งงอ ยาว 1-2 ซม. มีหนามสั้น ๆ ตรง 1 อัน ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกตามปลายกิ่ง ยาว 8-10 ซม. ใบประดับสีน้ำตาลอมม่วง โคนสีเขียว หรือทั้งใบสีแดงอมเขียวหรือม่วงอมน้ำตาล รูปไข่ กว้าง ยาวได้ถึง 1.5 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม กลีบเลี้ยงยาว 0.8-1 ซม. คุ้นอกขนาดใหญ่กว่าคุ้นใน ปลายมีติ่งหนาม ดอกสีส้มหรือเหลือง หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 3 ซม. กลีบบน 4 กลีบ เรียงซ้อนแผ่ชิดกัน ยาว 1-2 ซม. กลีบล่างขนาดเล็ก พังอเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 2 อัน ยาวประมาณ 2 ซม. ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 ซม. ผลรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน แบน ยาวประมาณ 1.5 ซม. มี 2 ซีก แต่ละซีก มี 1-2 เม็ด
นิเวศวิทยา	มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐมอริเชียส นอกชายฝั่งแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดีย
ประโยชน์	รากและใบมีสรรพคุณใช้ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย โรคนงูสวัด