



สวนพฤกษศาสตร์ ราชภัฏบรายน



อังกาบหนู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barleria prionitis L.

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE

ชื่ออื่น ๆ

เขี้ยวแก้ว, เขี้ยวเนื้อ (ภาคกลาง); มันไก่ (ภาคเหนือ)

ชื่อสามัญ

-

ลักษณะทั่วไป

ไม้พุ่ม สูง 1-1.5 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ลำต้นเกลี้ยง มีหนามยาวรอบข้อ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม ปลายเป็นติ่งแหลม โคนใบ เรียวสอบจรดก้านใบ ขอบใบมีขนแข็ง แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มกระจายด้านล่าง ใบตามข้อ ดอกมีขนาดเล็กกว่าตามลำต้น ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ออก หนาแน่นช่วงปลายกิ่งคล้ายช่อเชิงลดสั้นๆ ใบประดับรูปแถบ ใบประดับย่อยเป็น หนาม ติดทน กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม ขนาดไม่เท่ากัน คู่บนมีขนาดใหญ่ กว่า ปลายเป็นติ่งหนาม กลีบคู่ในรูปไข่ ปลายแหลมยาว กลีบดอกคล้ายรูปปากเปิด กลีบดอก 5 กลีบ สีส้ม ผลแบบแคปซูล รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายเป็นจะงอย เมล็ดแบน รูปคล้ายรูปไข่ มีขนคล้ายไหมแบนราบ

นิเวศวิทยา

ขึ้นหนาแน่นและเป็นวัชพืชตามเขาหินปูนที่แห้ง มีแนวเขตการกระจายพันธุ์ในอินเดีย แอฟริกา เอเชีย

ประโยชน์

ใบ, ต้น รสฝืดอนเมา แก้พิษงู แก้หวัด แก้ไข้ แก้ลมพาต แก้ปวดข้อ แก้คัน แก้บวม เคี้ยวแก้ปวดฟัน พอกทา แก้ปวดหลัง ขับปัสสาวะ พอกโลหิตระดู เข้ายาแก้มะเร็ง ราก รสขมฝืดอน แก้ไข้ แก้อาหารไม่ย่อย แก้กลากเกลื้อน