



สวนพฤกษศาสตร์ รมยง



ไทรทอง
Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz
ERYTHROXYLACEAE

ไทรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Erythroxylum cuneatum</i> (Miq.) Kurz
ชื่อวงศ์	ERYTHROXYLACEAE
ชื่ออื่น ๆ	แก่นแดง (ปราจีนบุรี); ไทรทอง (ภาคใต้); พิกุลทอง (ประจวบคีรีขันธ์)
ชื่อสามัญ	Wild cocaine.
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 30 ม. หูใบอยู่ในซอกก้านใบ ติดทน ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 4–10 ซม. ปลายมนหรือเว้าตื้น ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ใบประดับ 2 ใบ ขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 0.3–1 ซม. ขยายในผล หลอดกลีบเลี้ยงสั้น กลีบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก มี 5 กลีบ ติดทน กลีบดอกเรียงซ้อนเหลื่อมในตาดอก มี 5 กลีบ รูปขอบขนาน โคนมีลื่นสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 10 อัน เชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวไม่เท่ากัน 2 ชุด ยาวกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย ติดทน รังไข่มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวูล 1–2 เม็ด ส่วนมากพัฒนาช่องเดียว ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน ติดทน ผลผนังชั้นในแข็ง รูปขอบขนาน ยาว 0.8–1 ซม. สุกสีแดง เมล็ดแบน เรียว ผิวเป็นร่อง
นิเวศวิทยา	พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว สุมาตรา ชวา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่งทะเล
ประโยชน์	เปลือกต้น แก้เส้นเอ็นพิการ ปวดเมื่อย เหน็บชา ชาตามปลายมือปลายเท้า บำรุงร่างกาย