



สวนพฤกษศาสตร์ระยอง



ไคร้ย่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elaeocarpus grandiflorus Sm.

ชื่อวงศ์

ELAEOCARPACEAE

ชื่ออื่น ๆ

กาบพร้าว (นราธิวาส), สารภีน้ำ ไคร้ย่อย (เชียงใหม่), จิก ดอกปีใหม่ (กาญจนบุรี), แต้วน้ำ (บุรีรัมย์), ปูมปา (เลย), คล้ายสองหู ผีหน้าย (สุราษฎร์ธานี), มุ่นน้ำ (เพชรบูรณ์), อะโน (ปัตตานี)

ชื่อสามัญ

Fairy Petticoats, Lily Of The Valley.

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น สูงได้ประมาณ 30 เมตร หน่อใบหลุดร่วงง่าย ใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับหรือรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ้ม ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่มหรือเกือบเกลี้ยง เส้นแขนงใบมี 6-9 คู่ ด้านล่างมักมีต่อมใบ ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ก้านดอกย่อยกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ผิวเกือบเกลี้ยงทั้งสองด้าน กลีบดอกรูปไข่ ผิวมีขนกระจายทั้งสองด้าน มีริ้วขนที่โคนกลีบด้านใน 2 ริ้ว ปลายกลีบจักเป็นครุย เกสรเพศผู้รูปแถบ มี 25-60 อัน ติดบนจานฐานดอก ปลายอับเรณูเป็นรยางค์แข็ง ฐานฐานดอกหยักเป็นพู 10 รอยไม่ชัดเจน รังไข่มี 2 ช่อง รูปไข่ มีขนสั้นหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียรูปลิ้มแคบ มีขน ยอดเกสรแหลม ผล แบบมีเมล็ดเดี่ยวแข็ง (stone) รูปรี ปลายและโคนแหลม

นิเวศวิทยา

ขึ้นตามริมน้ำในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ระดับความสูงจนถึงประมาณ 800 เมตร

การกระจายพันธุ์

พบตั้งแต่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในประเทศไทยพบทุกภาค

ประโยชน์

ทรงพุ่มสวย ดอกสวย สีขาวมองเห็นได้ชัดเจน มีกลิ่นหอม ปลูกประดับสวน ริมน้ำ หน่น้ำท่วมขังให้ร่มเงา ควรปลูกริมศาลา ทำน้ำในสวน ผลดั่งดูสัตว์

แหล่งที่ศึกษาพบ

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง