



# สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



มะกอกเกลื่อน  
*Canarium subulatum* Guillaumin  
BURSERACEAE

## มะกอกเกลื่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Canarium subulatum</i> Guillaumin
ชื่อวงศ์	BURSERACEAE
ชื่ออื่น ๆ	กอกกั้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กอกเลื่อม (ปราจีนบุรี); เกี่ยม (ภาคเหนือ); ซาลัก (เขมร); มะกอกเกลื่อน (ราชบุรี); มะกอกเลือด (ภาคใต้); มะกอกเลื่อม (ภาคกลาง); มะเกี่ยม (ภาคเหนือ); มะฉิม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); มะเลื่อม, มักเหลี่ยม (จันทบุรี); โมกเลื่อม (ปราจีนบุรี)
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 30 ม. เปลือกแตกเป็นสะเก็ด กิ่งมีช่องอากาศ หูใบรูปลิ้มแคบ มีขนสั้นนุ่ม ใบประกอบมีใบย่อย 2-5 คู่ ใบย่อยรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 4-18 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนเบี้ยว ขอบจักฟันเลื่อย แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขน ก้านใบยาว 1-2 ซม. ใบปลายยาว 3-4 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกเพศผู้ยาวกว่าช่อดอกเพศเมีย ดอกสีครีม กลีบรูปคล้ายเรือ เกสรเพศผู้ติดที่โคนจานฐานดอก โคนเชื่อมติดกัน ฐานฐานดอกสีแดงอมส้ม จักเป็นพู่หรือเรียวยาว รังไข่และก้านเกสรเพศเมียมีขนยาว ผลรูปรี ยาว 3-4.5 ซม. หน้าตัดรูปสามเหลี่ยมมน ผนังหนา ไพรีนรูปรี ยาว 2-2.5 ซม.
นิเวศวิทยา	พบที่จันทอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าสนเขา ความสูงถึงประมาณ 1400 เมตร ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
ประโยชน์	ผลนำมารับประทานเป็นยาแก้ไอ ช่วยขับเสมหะ