



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



พັນจำ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Vatica odorata</i> (Griff.) Symington
ชื่อวงศ์	DIPTEROCARPACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ขี้มอด, ชัน (จันทบุรี); ซี (อุบลราชธานี); ต่าง(น่าน); ต่าเสา (ภาคใต้); ยางหนู, สัก (สุราษฎร์ธานี); สักเขา (ตรัง)
ชื่อสามัญ	Resak
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เปลือกสีน้ำตาลเทา กิ่งมีขนรูปดาวสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงหรือเกือบเกลี้ยง หน่อรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 มม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกม รูปไข่ หรือรูปไข่กลับ ยาว 5.5-12 ซม. มีเส้นแขนงใบแฉก ช่อดอกยาว 2-8 มม. ช่อแขนงย่อยมี 2-5 ดอก ตาดอกรูปใบหอก กลีบเลี้ยงรูปไข่ ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ดอกสีขาวมีปื้นชมพู เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ รังไข่ ผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. ปลายเป็นติ่งแหลม ปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก
นิเวศวิทยา	มีแนวเขตการกระจายพันธุ์ใน ภูมิภาคอินโดจีน พม่า คาบสมุทรมลายูและบอร์เนียว ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ทั่วทุกภาค ความสูงถึงประมาณ 600 เมตร ออกดอกเดือน ม.ค.-ก.พ. ติดผลเดือน มี.ค.-เม.ย.
ประโยชน์	เนื้อไม้ มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้ทำสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้ เช่น รอด ตง เส้า หรือกระดาน ชันที่ได้จากเปลือกไม้ สามารถนำมาผสมกับน้ำมันใช้ทาไม้ให้เป็นเงา และใช้ยาแนวเรือได้