



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



เอื้องหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Coelogyne trinervis</i> Lindl.
ชื่อวงศ์	ORCHIDACEAE
ชื่ออื่น ๆ	เอื้องเทียนขาว (ทั่วไป), เอื้องหมาก (เชียงใหม่)
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ ยาว 3–6 ซม. ใบมี 2 ใบ รูปใบหอกกลับแกมรูปไข่ ยาว 4–20 ซม. ปลายแหลม มีเส้นใบ 5–7 เส้น ก้านใบยาว 0.5–3 ซม. ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 10 ซม. มีใบคล้ายเกล็ดหุ้มเกือบตลอดความยาว แกนช่อดอกยาว 1.2–8.8 ซม. ปล้องยาว 1–2.5 ซม. ใบประดับร่วงเร็ว ช่อดอกมี 2–5 ดอก สีขาว กลีบเลี้ยงกลีบบนรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 2.4–3.3 ซม. ปลายแหลม กลีบคู่ข้างคล้ายกลีบบน กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง กลีบปากสีขาว รูปรี ยาว 2–2.7 ซม. จัก 3 พู พูข้างตั้งขึ้น กลม มีปื้นเหลืองและลายเส้นสีน้ำตาล พูกลางรูปไข่กว้าง ยาว 1–1.2 ซม. โคนสองข้างมีปื้นเหลือง ขอบน้ำตาล ขอบเรียบหรือจักไม่เป็นระเบียบ มีสัน 3 สัน เป็นแนวแคบ สันกลางสั้น เส้นยาว 1.3–1.6 ซม. ปลายกลม
นิเวศวิทยา	พบที่อินเดีย ภูฏาน เนปาล จีนตอนใต้ พม่า และลาว ในไทยพบทางภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และน่าน ขึ้นตามคดไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1300–2500 เมตร
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับ