



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



ว่านสาวหลง
Amomum schmidtii (K. Schum.) Gagnep.
ZINGIBERACEAE

ว่านสาวหลง

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Amomum schmidtii</i> (K. Schum.) Gagnep.
ชื่อวงศ์	ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น ๆ	เร่วหอม ว่านร้อนทอง เสน่ห่มหาพรหม
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	พืชล้มลุกอายุ ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า ลำต้นเหนือดินสูง 1-1.5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 5-8.5 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร ปลายมีติ่งยาว โคนสอบ ขอบเรียบ ด้านล่างมีขนนุ่ม มีกลิ่นหอม ช่อดอกแบบช่อเชิงลด เกิดจากลำต้นใต้ดิน ทรงรี กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ใบประดับก้านช่อรูปขอบขนาน ดอกสีขาวมีแถบสีเหลือง มีประสีแดงใกล้โคนกลีบ ใบประดับรูปขอบขนาน ใบประดับย่อยม้วนเข้าหากัน ยาว 1.5 เซนติเมตร ปลายหักสองถึงสามหัก กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ยาวประมาณ 3.5-4.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นสามแฉก สีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อน กลีบปากสีขาวกลางกลีบมีแถบสีเหลือง โคนกลีบมีประสีแดง กลีบรูปคล้ายพัด กลีบคู่ข้างลดรูป ผล ผลแบบผลแห้งแตก ทรงกลม มีขนปกคลุมและมีหนามสั้นประปราย
นิเวศวิทยา	ป่าดิบแล้ง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงใต้
ประโยชน์	เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำอางค์