



สวนพฤกษศาสตร์ระยอง



กะเรกะร่อน
Cymbidium aloifolium (L.) Sw.
ORCHIDACEAE

กะเรกะร่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cymbidium aloifolium (L.) Sw.

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE

ชื่ออื่น ๆ

กล้วยหางไหล (ชุมพร), กะเรกะร่อน (นครราชสีมา), เอื้องด้ามข้าว (ลำปาง), เอื้องปากเปิด (เชียงใหม่)

ชื่อสามัญ

-

ลักษณะทั่วไป

ลำต้น เป็นหัว รูปรี มีหลายข้อ และขึ้นชิดกันเป็นกอ ใบ รูปแถบ ขนาด 3 x 60 ซม. หนาและแข็ง ปลายใบเว้า ใบมีอายุหลายฤดูก่อนหลุดร่วง ดอก ช่อดอกยาว มี 1-2 ช่อ และห้อยลง ก้านช่อสั้นกว่าแกนช่อ ดอกขนาด 2.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก รูปแถบ กลีบดอกแคบและสั้นกว่ากลีบเลี้ยง ทั้ง 5 กลีบสีม่วงแดง ขอบกลีบสีเหลือง ปลายมน กลีบปากรูปรีกว้าง สีม่วงแดง มีแฉกข้างรูปสามเหลี่ยมตั้งชัน ปลายกลีบมน เมื่อบานเต็มที่ปลายกลีบม้วนลง กลางกลีบมีสันสีเหลือง 2 สัน เรียงขนานกัน เส้นกลางสีม่วง ฝากรอบกลุ่มเรณูสีเหลือง

เขตการกระจายพันธุ์

พบพื้นที่กว้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบทุกภูมิภาคของประเทศ