



สวนพฤกษศาสตร์ รมยง



เอื้องขาไก่ป่า
Flickingeria fimbriata (Blume) hawkes
ORCHIDACEAE

เอื้องขาไก่ป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Flickingeria fimbriata</i> (Blume) hawkes
ชื่อวงศ์	ORCHIDACEAE
ชื่ออื่น ๆ	กูดหิน (นครศรีธรรมราช), เอื้องแข้งไก่ปากหยัก (ทั่วไป), เอื้องข้างน้ำว (อีสาน)
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	ลำลูกกล้วยมีข้อเดียวและอยู่บนแขนงของเหง้า ใบรูปใบหอกแกมรูปไข่ มี 1 ใบ ขนาด 2.5-5 x 8-15 ซม. ปลายใบเว้าปุ่ม ช่อดอกสั้นมากแต่ละช่อมีจำนวนดอกน้อยทยอยบาน 1-2 ดอก ดอกใหญ่ขนาด 2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน กลีบดอกรูปแถบ ทั้งห้ากลีบปลายมน กลีบสีน้ำตาลและมีจุดสีเข้มทั่วกลีบ กลีบปากสีครีมมีหูปากรูปครึ่งวงกลม แผ่นกลีบมีสันย้วย 3 สันขอบกลีบหยักย้วย
นิเวศวิทยา	พบในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้นตามที่ร่ม รำไร จีน พม่า เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับ