



สวนพฤกษศาสตร์ระยอง



ค้ำคาวดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tacca chantrieri* André

ชื่อสามัญ Bat flower

ชื่ออื่น ๆ ว่านหัวเลีย ว่านหัวลา ว่านหัวฟา (จันทบุรี) ค้ำคาวดำ มังกรดำ (กรุงเทพฯ) ดีปลาช่อน (ตราด) ม้าถอนหลัก (ชุมพร) ว่านพังพอน (ยะลา) นิลพูสี (ตรัง) ว่านนางครวญ (นครศรีธรรมราช) กลาดี้กลามูยี (มลายู-ปัตตานี) ตึงหว่า (ภาคเหนือ) เนระพูสีไทย (ภาคกลาง) เสแห่งเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง) ล่อเคลิน (ลี้ะ) เหนียบเลน (ชม)

ชื่อวงศ์ DIOSCOREACEAE

ลักษณะ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ใบเดี่ยว เรียงวนสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน โคนใบมน ปลายใบแหลม สีเขียวเข้ม โคนก้านแผ่นเป็นกาบสีเขียวเข้ม ช่อดอกออกจากซอกใบ ดอกห้อยลง มีมากกว่า 20 ดอก ต่อช่อ สีม่วงคล้ำ มีใบประดับมากกว่า 4 ใบ สีเขียวคล้ำคล้ายปีกค้ำคาว ใบประดับย่อยเป็นเส้นยาวเท่ากับจำนวนดอก

การขยายพันธุ์ แยกหน่อ เพาะเมล็ด

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ และใช้เป็นสมุนไพรบำรุงกำลัง