



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



กะเบือขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Clerodendrum lloydianum</i> Craib.
ชื่อวงศ์	LAMIACEAE
ชื่ออื่น ๆ	-
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่มเตี้ย สูงได้ประมาณ 1.5 ม. ส่วนต่าง ๆ มีขนสั้นนุ่ม ขั้วไม่มีแถบขน ไม่มีหูใบ ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปขอบขนานถึงรูปไข่หอก ส่วนมากยาว 15–30 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ้ม แผ่นใบด้านบนมีขนยาว ขอบจักซี่ฟันห่าง ๆ ขอบมีขนครุย เส้นแขนงใบข้างละ 8–10 เส้น ก้านใบยาว 1.5–9 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ตั้งขึ้น ยาว 10–35 ซม. ดอกเรียงห่าง ๆ ใบประดับคล้ายใบ ใบประดับย่อยรูปเส้นด้าย ดอกสมมาตรด้านข้าง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันที่โคน มีขนต่อม กลีบรูปไข่หอก กลีบดอกสีขาว กลีบรูปไข่กลับ ขนาดไม่เท่ากัน เกสรเพศผู้มี 2 คู่ยาวไม่เท่ากัน ติดภายในหลอดกลีบดอก ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก เกสรเพศเมีย อับเรณูติดด้านหลัง มี 2 พู แตกตามยาว โคนรูปเงี่ยงลูกศร รั้งไขเหนียววงกลีบ มี 4 ช่อง แต่ละช่องมีอวุลเม็ดเดียว ก้านเกสรเพศเมียเรียว ยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ยอดเกสรจัก 2 พู ผลผนังชั้นในแข็ง สด มี 4 พู กลีบเลี้ยงติดทน
นิเวศวิทยา	พบที่เวียดนามและไทย ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา หรือบนเขาหินปูน ความสูง 150–1,550 ม.
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับ